


**Bezprostředně před** jakoukoli manipulací s katétre a s ním souvisejícím systémem intravenózní medicíny, jako např.:

2a Zavádění nebo odstranění katétru (před nasazením čistých, nesterilních rukavic), výměna oděvu, odběr krve nebo před přípravou pomůcek potřebných pro tyto výkony

2b Vstup (otevření) do infuzní linky a infuzního systému

2c Příprava intravenózního léčiva.



**Okamžitě po** jakémkoli úkonu, při kterém mohlo dojít ke styku s tělesnými tekutinami jako např.:

- 3a Zavádění nebo odstraňování katétru
- 3b Odběr krve

\*Podle posterů WHO hand hygiene improvement approach, URL: [http://www.who.int/entity/gpsc/5may/EN\\_PSP\\_GPSC1\\_5May\\_2015/en/index.html](http://www.who.int/entity/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2015/en/index.html)  
© World Health Organization 2015. Veškerá práva vyhrazena.

## DALŠÍ KLÍČOVÉ POSTUPY PŘI PÉČI O PERIFERNÍ ŽILNÍ KATÉTR

1. **Indikace:** Ujistěte se, že periferní žilní katétr je indikován. Pokud již katétr nadále není potřeba či již není indikován, odstraňte jej.
2. **Zavedení katétru / péče o katétr / odstranění katétru**
  - 2.1 Před zavedením katétru proveďte přípravu kůže antiseptickým přípravkem (70% alkoholem, jodovou tinkturou, jodoformem, nebo 2% chlorhexidylglukonátem na alkoholové bázi).
  - 2.2 Pro zavedení katétru, jeho odstranění a při odběru krve použijte čisté nesterilní rukavice a postupujte aseptickým postupem (technikou bez dotyku).
  - 2.3 Každé 2 dny měňte gázové krytí.
  - 2.4 Zvažte plánovanou výměnu katétru každých 96 hodin.
- 2.5 Sety a Hadičky sloužící k podání krve, krevních produktů, chemoterapie a tukových emulzí vyměňte do 24 hodin od zahájení infuze. Zvažte výměnu všech ostatních setů a hadiček každých 96 hodin.
3. **Sledování:** Zaznamenejte datum a čas zavedení katétru, odstranění a výměny krytí, každý den zaznamenávejte stav místa zavedení katétru.



# 5 MOMENTŮ PRO HYGIENU RUKOU

Soustředěno na péči o pacienty s periferním žilním katétre\*