


Při manipulaci s močovým katétre a sběrným systémem si dezinfikujte ruce.

Bezprostředně před před jakoukoli manipulací s močovým katétre nebo sběrným systémem, která by mohla vést ke kontaminaci sterilní moči, jako například v těchto situacích:

- 2a. Zavádění nebo aplikace permanentního močového katétru, intermitentního, kondomového katétru; bezprostředně před nasazením sterilních rukavic
- 2b. Přístup k sběrnému systému za účelem odběru vzorku moči

PROČ? Z důvodu ochrany pacienta před nebezpečnými mikroorganismy, včetně jeho vlastních, které by mohly proniknout do jeho těla.



Při manipulaci s močovým katétre a sběrným systémem si dezinfikujte ruce.

Okamžitě po jakémkoli úkonu s močovým katétre nebo sběrným systémem, při kterém by mohlo dojít ke styku s močí, jako např. v těchto situacích:

- 3a. Odběr vzorku moči
- 3b. Vyprázdnění sběrného sáčku
- 3c. Odstranění močového katétru

PROČ? Z důvodu Vaší ochrany a ochrany zdravotnického prostředí před nebezpečnými mikroorganismy pacienta.



Private
Organizations
for Patient
Safety

PŘIPOJTE SE
KE KAMPANI
PRO HYGIENU RUKOU

5 dalších klíčových postupů při péči o pacienty s močovým katétre

- Přesvědčte se, že indikace permanentního močového katétru je podložena potřebnou indikací.
- Používejte uzavřený sběrný systém a udržujte jej uzavřený.
- Katétre zavádějte aseptickým postupem za použití sterilních rukavic.
- Každý den provádějte posouzení za účelem stanovení, zda je použití katétru stále nezbytné.
- Pacienti s permanentním močovým katétre nepotřebují léčbu antibiotiky (včetně bezpříznakové bakteriurie), pokud není zdokumentována přítomnost infekce.

© Autorská práva World Health Organization (WHO) 2014.
Veškerá práva vyhrazena URL http://www.who.int/gpsc/5may/hh-urinary-catheter_poster.pdf?ua=1



MÝCH 5 SITUACÍ PRO HYGIENU RUKOU

Zaměřeno na péči o pacienty s močovým katétre*